

SYMPTOMY UŽITÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK orientační pomůcka pro osoby provádějící screeningové vyšetření na návykové látky	ALKOHOL	CANNABINOIDY	OPIÁTY	STIMULANTY	KLUBOVÉ DROGY	DISSOCIATIVA	HALUCINOGENY	INHALANTY	DEPRESANTY
<b>fyzické projevy</b>									
ztráta fyzické kontroly	•	•			•	•	•	•	
tlumení bolesti	•		•			•			
munlání	•					•		•	
pocení	•				•	•			
zvýšená tělesná teplota				•	•		•		
zvýšená tepová frekvence				•		•	•		
zvýšená chuť k jídlu		•							
neostré vidění	•							•	•
svalové křeče		•			•				
svalové napětí					•	•			
nevolnost, zvracení	•	•	•		•	•	•	•	
ztráta chuti k jídlu, ztráta váhy			•	•			•	•	
třesení, rozechvění	•			•	•				
pomalé či ztěžklé dýchání	•		•			•		•	•
zpomalená tepová frekvence	•		•					•	•
zúžené zornice			•						
rozšířené zornice				•		•	•	•	•
závratě		•	•				•	•	•
zácpa			•						
bolesti hlavy	•				•		•	•	•
boláky v obličeji a na kůži			•	•				•	
vysoké dávky mohou způsobit kóma	•		•						
vysoké dávky vedou k smrti	•		•						•
<b>projevy psychické/emoce</b>									
deprese	•			•	•	•	•	•	
euforie		•	•	•	•	•	•	•	•
podrážděnost	•		•	•				•	•
paranoia	•			•		•	•		
panické záchvaty		•		•		•	•		•
nekontrolovaný smích		•				•	•		
iluze empatie		•			•		•		
úzkost				•	•	•	•		
zvýšená sebedůvěra				•			•		
může vést k sebevraždným tendencím				•					•
halucinace	•	•		•		•	•		•
vysoké dávky či časté užívání může vyvolat psychózu		•		•		•			•

Pozn. Lindgrove, s.r.o.: Tabulka poskytuje neúplný a rozsahem nevyčerpávající přehled symptomů užití návykových látek, proto výslovně upozorňujeme, že pouze na základě uvedených údajů nemohou být činěna jakákoliv závažná rozhodnutí. V žádném případě jí nelze nahradit vyhodnocení symptomů kvalifikovaným lékařem. Vylučujeme odpovědnost za případné tiskové chyby.  
(verze dokumentu 060115)

Lindgrove, s.r.o., [info@lindgrove.com](mailto:info@lindgrove.com), tel. 724 309 398

SYMPTOMY UŽITÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK orientační pomůcka pro osoby provádějící screeningové vyšetření na návykové látky	ALKOHOL	CANNABINOIDY	OPIÁTY	STIMULANTY	KLUBOVÉ DROGY	DISSOCIATIVA	HALUCINOGENY	INHALANTY	DEPRESANTY
<b>vliv na myšlení</b>									
ztráta paměti, potíže se zapamatováním	•	•	•		•	•	•	•	•
zmatení	•	•	•		•	•	•	•	•
potíže se soustřednou pozorností	•	•	•		•	•	•	•	•
zvýšená pozornost, jasnost myšlení		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>vliv na chování</b>									
ztráta zábrán	•	•	•		•	•	•	•	•
chabý úsudek	•	•	•		•	•	•	•	•
spouštěč násilného chování	•	•	•	•	•	•	•	•	•
agresivní projevy	•	•	•	•	•	•	•	•	•
pomalé reakce	•	•	•		•	•	•	•	•
<b>vliv na energii</b>									
mátožnost	•	•	•		•	•	•	•	•
pomalost, letargie		•	•		•	•	•	•	•
slabost		•	•		•	•	•	•	•
utlumení	•	•	•		•	•	•	•	•
zvýšená energie		•	•	•	•	•	•	•	•
ztráta potřeby spánku		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>vliv na vnímání</b>									
oddělení od těla		•	•		•	•	•	•	•
oddělení od prostředí		•	•		•	•	•	•	•
ztráta vnímání rychlosti		•	•		•	•	•	•	•
ztráta vnímání vzdálenosti	•	•	•		•	•	•	•	•
zvýšení intenzity smyslového vnímání		•	•		•	•	•	•	•



Pozn. Lindgrove, s.r.o.: Tabulka poskytuje neúplný a rozsahem nevyčerpávající přehled symptomů užití návykových látek, proto výslovně upozorňujeme, že pouze na základě uvedených údajů nemohou být činěna jakákoliv závažná rozhodnutí. V žádném případě jí nelze nahradit vyhodnocení symptomů kvalifikovaným lékařem. Vylučujeme odpovědnost za případné tiskové chyby.  
(verze dokumentu 060115)

Lindgrove, s.r.o., [info@lindgrove.com](mailto:info@lindgrove.com), tel. 724 309 398